

A : Scuola Primaria e Materna Papa Wojtyla

Oggetto: **Segnalazione casi di scarlattina nella Scuola Primaria e Materna Papa Wojtyla**

Si comunica che tra gli alunni della Scuola **Primaria e Materna Papa Wojtyla** è stato accertato un caso di scarlattina.

È opportuno pertanto che le famiglie controllino i propri figli per l'eventuale comparsa di mal di gola e/o febbre.

In caso di presenza di sintomi è bene consultare un medico. In assenza di sintomatologia non è prevista l'esecuzione di analisi cliniche o tamponi.

Si consiglia alla direzione scolastica di procedere ad areare, il più possibile, i locali e disinfettare pavimenti delle aule, banchi e sedie, giocattoli e sussidi didattici.

Si fornisce, inoltre, nell'ambito di un'azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, un'informativa sulla scarlattina.

DEFINIZIONE

La scarlattina è una malattia infettiva batterica dovuta allo Streptococco beta emolitico di gruppo A.

DESCRIZIONE

Come ci si contagia.

Ci si contagia da persona a persona, tramite le goccioline respiratorie di saliva, per contatto diretto con un soggetto infetto emesse con la tosse, gli starnuti o anche semplicemente parlando. Un soggetto è molto contagioso durante la fase acuta della scarlattina, è poco infettante nel periodo che precede la malattia, e non lo è più dopo 24-48 ore dall'inizio della terapia antibiotica.

Periodo di incubazione.

In seguito al contagio, lo Streptococco si moltiplica nella gola senza dare disturbi per 1-3 giorni, poi la malattia si manifesta.

Contagiosità.

In genere i primi sintomi compaiono dopo 1-3 giorni dal contagio. Di norma un malato è contagioso da 1-2 giorni prima dell'inizio dei sintomi e per tutta la durata della malattia; se viene instaurata un'adeguata terapia antibiotica, dopo 48 ore il soggetto non è più contagioso.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o informazione al seguente indirizzo email: umv@aslroma1.it.

Assistente Sanitario

Noemi Rossi

Medico: Alessio Pendenza